

## Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού

Διάλεξη 11: 18.11.2014

Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος

Γραφείς: Μανιάτης Σπυρίδων & Μυρισιώτης Δημήτριος & Σ. Κ.

### 11.1 Ξανά περί lineality space

Υπενθυμίζεται η έννοια του lineality space και παρατίθεται ένα παράδειγμα σχετικό με αυτόν τον χώρο.

**Ορισμός 11.1** Έστω πολυέδρο  $P = \{x \mid Ax \leq b\}$ . Ως lineality space του πολυέδρου  $P$ , ή  $\text{lin}(P)$ , ορίζεται η ποσότητα:

$$\text{rec}(P) \cap -\text{rec}(P) = \{y \mid Ay = 0\}.$$

Εναλλακτικά, κάποιος δύναται να γράψει

$$\text{lin}(P) := \text{rec}(P) \cap -\text{rec}(P) = \{y \mid Ay = 0\}.$$

Ο συγκεκριμένος όρος, μέχρι στιγμής, δεν έχει αποδοθεί ικανοποιητικά στα ελληνικά.

**Παράδειγμα 11.1** Έστω ημίχωρος  $P$ , με

$$P = \{x \mid \alpha^T x \leq \beta\}.$$

Στο Σχήμα 11.1, παρουσιάζεται η μορφή του  $P$  με τρόπο τέτοιο ώστε εξηγείται η φύση του χώρου  $\text{lin}(P)$ , ως χώρου που περιέχει τις κατευθύνσεις που δεν οδηγούν εκτός του πολυέδρου.

### 11.2 Υποδηλούμενες Ισότητες

Ακολουθεί ο ορισμός των υποδηλούμενων ισοτήτων, που ανακύπτουν σε ένα σύστημα της μορφής  $Ax \leq b$ . Επίσης, παρουσιάζονται κάποια βασικά αποτελέσματα σχετικά με τις ισότητες αυτές.


**Ορισμός 11.2** Έστω σύστημα ανισώσεων  $Ax \leq b$ . Μία ανισότητα  $\alpha_i^T x \leq b_i$  του συστήματος καλείται υποδηλούμενη ισότητα (implicit equality) αν

$$Ax \leq b \implies \alpha_i^T x = b_i.$$

Θεωρούμε ένα  $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\}$ . Αν η  $\alpha_i^T x \leq b_i$  είναι υποδηλούμενη ισότητα του συστήματος

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_i^T x = b_i\}.$$

Με βάση τον Ορισμό 11.2, το σύστημα  $Ax \leq b$  διαμερίζεται σε δύο υποσυστήματα:



Σχήμα 11.1: Οι χώροι  $P$  και  $\text{lin}(P)$ .

- Στο υποσύστημα  $A^-x \leq b^-$ , που περιέχει τις υποδηλούμενες ισότητες του  $Ax \leq b$ , και
- το υποσύστημα  $A^+x \leq b^+$ , που περιέχει τις υπόλοιπες ανισότητες του  $Ax \leq b$ .

Τα αντίστοιχα σύνολα δεικτών είναι τα  $I^-$  και  $I^+$  και, αν  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , τότε

$$I^- \cup I^+ = I^- \uplus I^+ = \{1, \dots, m\}.$$

Οπότε, σχετικά με το πολύεδρο  $P$ , έχουμε ότι

$$\begin{aligned} P &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x \leq b^-, A^+x \leq b^+\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-, A^+x \leq b^+\}. \end{aligned}$$

Η Πρόταση 11.1, που ακολουθεί, αιτιολογεί την ύπαρξη κάποιου  $\bar{x}$  στο σχετικό εσωτερικό (relative interior) του πολύεδρου.

**Πρόταση 11.1** Έστω μη κενό πολύεδρο  $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\}$ . Τότε

$$(\exists \bar{x}) [A^- \bar{x} = b^- \ \& \ A^+ \bar{x} < b^+].$$

**Απόδειξη.** Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις, ανάλογα αν  $I^+ = \emptyset$  ή  $I^+ \neq \emptyset$ .

$[I^+ = \emptyset]$  Στην περίπτωση αυτή το συμπέρασμα συνάγεται τετριμμένα, καθώς αν  $I^+ = \emptyset$  κάθε ανισότητα είναι υποδηλούμενη ισότητα.

$[I^+ \neq \emptyset]$  Στην περίπτωση αυτή, έχουμε ότι

$$(\forall i \in I^+) (\exists x^i \in P) [\alpha_i^T x^i < b_i].$$

Οπότε, θέτουμε

$$\bar{x} = \frac{1}{|I^+|} \sum_{i \in I^+} x^i,$$

και παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο  $\bar{x}$  ικανοποιεί τις

$$A^-\bar{x} = b^- \text{ \& } A^+\bar{x} < b^+.$$

■

Ακολουθεί το Θεώρημα 11.1 που αποδεικνύει μερικές ενδιαφέρουσες ιδιότητες, για μη κενά πολύεδρα, βασιζόμενο στην έννοια των υποδηλούμενων ισοτήτων.

**Θεώρημα 11.1** Έστω μη κενό πολύεδρο  $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\}$ . Τότε

(i)  $\text{aff}(P) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\}$ , και

(ii)  $\dim(P) = n - \text{rank}(A^-)$ .

**Απόδειξη.** Αποδεικνύουμε χωριστά τις δύο ιδιότητες.

(i). Ισχύει ότι

$$P \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\}$$

οπότε,

$$\text{aff}(P) \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\}.$$

Άρα απομένει να αποδειχθεί ότι

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\} \subseteq \text{aff}(P).$$

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θεωρούμε ένα αυθαίρετο σημείο  $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ , με

$$A^-\hat{x} = b^-$$

και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι  $\hat{x} \in \text{aff}(P)$ .

Από την Πρόταση 11.1, υπάρχει κάποιο  $\bar{x}$  τέτοιο ώστε


$$A^-\bar{x} = b^- \text{ \& } A^+\bar{x} < b^+. \tag{11.1}$$

Στην συνέχεια, θεωρούμε —ως  $S$ — το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα σημεία  $\hat{x}$  και  $\bar{x}$ . Παρατηρούμε ότι

$$S \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\}.$$

Θεωρούμε, επίσης, ένα σημείο  $x' \in S$  τέτοιο ώστε βρίσκεται «αρκούντως κοντά» στο  $\bar{x}$  (βλ. Σχήμα 11.2) ή, για κάποιο «μικρό»  $\varepsilon > 0$ ,

$$x' := \bar{x} + \varepsilon(\hat{x} - \bar{x}) = (1 - \varepsilon)\bar{x} + \varepsilon\hat{x}.$$



Σχήμα 11.2: Τα διανύσματα  $\bar{x}$ ,  $\hat{x}$  και  $x'$ , και το ευθύγραμμο τμήμα  $S$ .

Έχουμε ότι  $x', \bar{x} \in S$ . Αν, επιπλέον, αποδείξουμε ότι  $x' \in P$  μπορούμε να συνάγουμε ότι

$$\bar{x}, x' \in \text{aff}(P) \tag{11.2}$$

και, από την (11.2), ότι η ευθεία που φέρει το τμήμα  $S$  ανήκει στο  $\text{aff}(P)$ . Τελικά, επειδή  $\hat{x} \in S$ , λαμβάνουμε, επίσης, ότι

$$\hat{x} \in \text{aff}(P)$$

και η απόδειξη του (i) θα έχει ολοκληρωθεί.

Απομένει να δείξουμε ότι όντως  $x' \in P$ . Αρκεί να αποδείξουμε ότι

(a)  $A^- x' \leq b^-$ , και,

(b)  $A^+ x' \leq b^+$ .

Εδώ υπάρχει ένα λεπτό σημείο. Αν δείξουμε ότι  $A^- x' < b^-$  και  $A^+ x' \leq b^+$  έπεται ότι  $x' \notin P$ . Η συνύπαρξη των (α) και (β) στο ίδιο σύστημα απαγορεύει την αυστηρή ανισότητα στο υποσύστημα (α).

Αν θέσουμε  $\theta_i = \varepsilon(\hat{x}_i - \bar{x}_i)$  από τον ορισμό του  $x'$  παίρνουμε ότι

$$x' = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 + \theta_1 \\ \bar{x}_2 + \theta_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_n + \theta_n \end{bmatrix}.$$

Από την (11.1), παρατηρούμε ότι — για κατάλληλο  $\varepsilon$  — η απόλυτη τιμή κάθε  $\theta_i$  είναι «αρκούντως μικρή». Συνεπώς  $A^+ x' \leq b^+$ . Επιπλέον

$$A^- x' = A^-(\bar{x} + \varepsilon(\hat{x} - \bar{x})) = b^- + \varepsilon(b^- - b^-) = b^-.$$

Άρα λαμβάνουμε ότι  $x' \in P$ .

(ii). Ισχύει ότι

$$\text{aff}(P) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\}.$$

Εύκολα αποδεικνύεται η παρακάτω πρόταση.

**Πρόταση 11.2** (i) Τα σημεία  $x_0, x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$  είναι αφινικά ανεξάρτητα αν και μόνο αν  $\dim(\text{aff}(\{x_0, x_1, \dots, x_m\})) = m$ . (ii) Αν  $\{x_0, x_1, \dots, x_m\} \subseteq X \subseteq \mathbb{R}^n$ , είναι ένα μέγιστο σύνολο αφινικά ανεξάρτητων διανυσμάτων του  $X$ , τότε  $\text{aff}(X) = \text{aff}(\{x_0, x_1, \dots, x_m\})$ .

Από την Πρόταση 11.2 προκύπτει ότι

$$\dim(P) = \dim(\text{aff}(P)).$$

Επίσης

$$\begin{aligned} \dim(\text{aff}(P)) &= \dim(\{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\}) \\ &\stackrel{\text{Γρ. Άλγ.}}{=} n - \text{rank}(A^-). \end{aligned}$$

Η απόδειξη είναι πλέον πλήρης. ■

### \*11.3 Εναλλακτική απόδειξη του Θεωρήματος 11.1

Εδώ δίνουμε μια λίγο διαφορετική, αλγεβρική, απόδειξη των προτάσεων

- (i)  $\text{aff}(P) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\}$ , και  
 (ii)  $\dim(P) = n - \text{rank}(A^-)$ .

Θεωρήστε τον γραμμικό υπόχωρο  $L_P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = 0\}$ . Ισχύει ότι  $L_P \supseteq \text{lin}(P)$ . Θέτουμε  $m^- = \text{rank}(A^-)$ . Η διάσταση του  $L_P$  είναι  $n - m^-$  και έστω  $y^1, \dots, y^{n-m^-}$  μια βάση του  $L_P$ . Για κατάλληλο  $\varepsilon > 0$  έχουμε ότι  $\bar{x} + \varepsilon y^i \in P$  για  $i = 1, \dots, n - m^-$ . Αφού τα διανύσματα  $\varepsilon y^1, \dots, \varepsilon y^{n-m^-}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα τα διανύσματα  $\bar{x}, \bar{x} + \varepsilon y^1, \dots, \bar{x} + \varepsilon y^{n-m^-}$  είναι αφινικά ανεξάρτητα. Επομένως

$$\dim(P) \geq n - m^-. \tag{11.3}$$

Όμως  $P \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\}$  και άρα η (11.3) ισχύει με ισότητα αφού  $P \neq \emptyset$  και  $\dim\{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\} = \dim(L_P) = n - m^-$ .

Κατά συνέπεια, το σύνολο  $\{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\}$  είναι αφινικός υπόχωρος με τη μικρότερη δυνατή διάσταση η οποία περιέχει το  $P$ .

**Ισχυρισμός 11.1** Έστω  $X \subseteq Y$  δύο αφινικοί υπόχωροι στο  $\mathbb{R}^n$ . Αν  $\dim(X) = \dim(Y)$ , τότε  $X = Y$ .

**Απόδειξη ισχυρισμού.** Θέτουμε  $m = \dim(X)$ . Έστω  $\{x_0, x_1, \dots, x_m\} \subseteq X$  ένα σύνολο  $m + 1$  αφινικά ανεξάρτητων διανυσμάτων. Από την Πρόταση 11.2(ii)  $\text{aff}(Y) = \text{aff}(\{x_0, x_1, \dots, x_m\})$ . ■

Από τον Ισχυρισμό 11.1 παίρνουμε ότι  $\text{aff}(P) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A^-x = b^-\}$  και η απόδειξη είναι πλήρης.